Atmosfera

Roberto Bedogni

INAF Osservatorio Astronomico di Bologna

via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia

Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700

<http://www.bo.astro.it/~bedogni>

email: roberto.bedogni@oabo.inaf.it

L'atmosfera terrestre

Proprietà fisiche dell'atmosfera terrestre

Atmosfera terrestre-luce zodiacale

F. Patat, ESO, <http://www.eso.org/~fpatat/science/skybright/skybright.ppt>

[OI] 6300,6364 (300km) N 5200 (258km) –lunghezza d'onda righe

Proprietà fisiche dell'atmosfera terrestre

Alpi e pianura padana

L'atmosfera è costituita dallo **strato di gas che circonda un pianeta**

L'atmosfera della Terra è **sottile** (~ 10 km 1,5% del raggio)

La **pressione** è data dalle collisioni delle molecole dei gas

La pressione diminuisce con l'altezza, quindi il gas è più compresso verso il basso

Il gas è in equilibrio idrostatico

Il ruolo dell'albedo nel riscaldamento della Terra

Marzo 2005, misurata dagli strumenti del "Clouds and Earth's Radiant Energy System (CERES)"

NASA's Terra satellite

Il riscaldamento (senza atmosfera) dipende dalla distanza dal Sole ~ 150 milioni di km dall'albedo, $A = \text{energia riflessa} / \text{energia incidente}$

Albedo

$A = 0$ nessuna riflessione, tutta l'energia viene assorbita;

$A=0,1-0,25$ rocce

$A=0,7$ nubi

$A=0,8$ ghiaccio

$A = 1$ tutta l'energia viene riflessa

$$A_{\text{Terra}} = 0,38$$

Bilancio energetico

Il Sole manda sulla Terra

341 W/m^2

Energia emessa ed energia ricevuta devono eguagliarsi

Variazione annuale dell'albedo della Terra

Albedo

$A = 0$ nessuna riflessione, tutta l'energia viene assorbita

$A=0,1-0,25$ rocce

$A=0,7$ nubi

$A=0,8$ ghiaccio

$A = 1$ tutta l'energia viene riflessa

$$A_{Terra} = 0,38$$

Il ruolo dell'albedo nel riscaldamento della Terra

la copertura nuvolosa il 22 gennaio 2006

Modello termico di un pianeta

f = costante solare = 1367 W/m^2
(al di fuori dell'atmosfera terrestre)
 R = raggio del pianeta
 A = albedo
 T = temperatura

$$\pi R^2 f (1-A) \quad \text{Energia assorbita}$$
$$4\pi R^2 \sigma T^4 \quad \text{Energia irradiata}$$

Uguagliando

$$T^4 = \frac{f(1-A)}{4\sigma}$$
$$T_{\text{Terria}} \approx 250 \text{ K} = -23 \text{ }^\circ\text{C} \quad ??$$

Ho sbagliato i conti?

No

Ho trascurato qualcosa?

Sì

Cosa?

Insolazione dei pianeti rispetto alla Terra

	Distanza in U.A.= 149 597 870 696,0 ± ,146 metri	F Luminosità solare sul pianeta in watt/m ² (al di fuori dell'atmosfera)	T _p Temperatura superficiale del pianeta senza atmosfera °C
Mercurio	0,387	8945	+161
Venere	0,723	2624	-20
Terra	1	1367	-23
Marte	1,523	588	-63
Giove	5,204	50	-171
Saturno	9,582	15	-196
Urano	19,201	3.7	-219
Nettuno	30,047	1.5	-228

Come mai allora la temperatura sulla Terra non è -25° C ???

Interazione della radiazione solare con l'atmosfera terrestre

Nei confronti della radiazione solare l'atmosfera agisce come un filtro

Proprietà fisiche dell'atmosfera terrestre

costante solare

$F_{\text{incidente}} = 1367 \text{ W/m}^2$
(radiazione solare incidente al di fuori dell'atmosfera terrestre)

radiazione superficiale

$F_{\text{superficie}} = 341 \text{ W/m}^2$

Proprietà fisiche dell'atmosfera terrestre

L'evoluzione della atmosfera terrestre

L'evoluzione della atmosfera terrestre

Effetto Serra

Effetto serra (greenhouse)

Bilancio energetico

dati da http://eosps0.gsfc.nasa.gov/eos_observ/pdf/Nov-Dec06.pdf

Bilancio energetico

Global Energy Flows W m^{-2}

Bilancio energetico

Bilancio energetico 2000-2004

Global	Solar adsorb	Net solar	Solar reflect	LH evap	SH	Rad uo	Back rad	Net LW	Net down
ISCCP FD	70.8	165.7	22.8	-	-	393.9	345.4	48.5	-
NRA	64.4	160.4	45.2	83.1	15.6	396.9	336.5	60.4	1.3
JRA	74.7	169.8	25.6	90.2	19.4	396.9	324.1	72.8	-12.6
KK	78.2	161.2	23.1	80.0	17	396	333	63	0.9
Land									
ISCCP FD	70.6	148.7	40.1	-	-	381.2	327.6	53.6	-
NRA	59.1	155.1	70.3	50.2	26.3	371.0	296.8	74.1	4.5
JRA	71.9	155.8	51.6	39.4	27.4	374.4	287.4	87.0	2.0
KK	78.0	145.1	39.6	38.5	27	383.2	303.6	79.6	0
Ocean									
ISCCP FD	70.8	172.0	16.3	-	-	398.7	352.0	46.7	9.7
NRA	66.3	174.9	36.2	95	11.7	406.2	350.8	55.4	0.2
JRA	75.6		16.2	108.5	16.6	405.0	337.3	67.7	-17.9
HOAPS				103.6	14.6	-	-	56.1	
KK	78.2	167.8	16.6	97.1	12	400.7	343.3	57.4	1.3

Effetto serra (greenhouse)

Parte della radiazione solare viene **riflessa** dall'atmosfera

Parte viene **assorbita** dagli specchi d'acqua e ne provoca l'evaporazione, formazione di nubi, riflessione della radiazione

Gran parte viene **assorbita** dal suolo e **riemessa** sotto forma di radiazione infrarossa. I **gas serra** assorbono la radiazione infrarossa e la riemettono in tutte le direzioni (determinano un riscaldamento dei bassi strati dell'atmosfera e del suolo sottostante)

Effetto serra (greenhouse)

Energia fotoni

I **fotoni infrarossi** sono assorbiti
Fanno vibrare e ruotare le molecole

I **fotoni visibili** sono trasmessi, alcuni
deviati (scattering). Quelli blu subiscono
scattering maggiore

I **fotoni ultravioletti** dissociano le molecole

I **fotoni X** dissociano e ionizzano
(strappano elettroni) le molecole_

La composizione delle atmosfere planetarie

Per comprendere perchè si ha l'effetto serra è necessario studiare la composizione chimica dell'atmosfera dei pianeti (terrestri)

	VENERE	TERRA	MARTE
Pressione (mbar)	100.000	1,000	6
	COMPOSIZIONE		
CO₂	>98%	0,0385%	96%
N₂	1%	78%	2,5%
Ar	1%	0,93%	1,5%
O₂	0,0%	21%	2,5%
H₂O	0,0%	0,33%	0-0,1%

Le atmosfere dei pianeti interni

ATMOSFERA DI MARTE

Marte

Terra

ATMOSFERA DI VENERE

Venere

L'effetto serra su Venere

La composizione dell'atmosfera terrestre

Azoto	78,08%
Ossigeno	20,95%
Argon	0,93%
<u>Vapore acqueo</u>	<u>0,33% (gas serra)</u>
Anidride carbonica	0,0400 % (400 ppm) (gas serra)
Neon	0,00181% (18 ppm)
Elio	0,0005 % (5 ppm)
Metano	0,0002 % (2 ppm) (gas serra)
Idrogeno	0,00005 % (0,5 ppm)
Kripton	0,000011 % (0,11 ppm)
Xeno	0,000008 % (0,08 ppm)
Ozono	0,000004 % (0,04 ppm)
Biossido di azoto	Tracce (gas serra)

La composizione dell'atmosfera terrestre

Atmosfera secca per volume	
ppmv: parti per milione	
Gas	Volume
Azoto (N ₂)	780 840 ppmv (78,084 %)
Ossigeno (O ₂)	209 460 ppmv (20,946 %)
Argon (Ar)	9 340 ppmv (0,9340 %)
Anidride Carbonica (CO ₂)	400 ppmv (0,040 %)
Neon (Ne)	18,18 ppmv (0,001818 %)
Elio (He)	5,24 ppmv (0,000524 %)
Metano (CH ₄)	1,79 ppmv (0,000179 %)
Krypton (Kr)	1,14 ppmv (0,000114 %)
Idrogeno (H ₂)	0,55 ppmv (0,000055 %)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	0,3 ppmv (0,00003 %)
Xenon (Xe)	0,09 ppmv (9×10^{-6} %)
Ozono (O ₃)	0,0 a 0.07 ppmv (0 % a 7×10^{-6} %)
Biossido di Azoto (NO ₂)	0,02 ppmv (2×10^{-6} %)
Iodio (I)	0,01 ppmv (1×10^{-6} %)
Monossido di Azoto (CO)	0,1 ppmv
Ammoniaca (NH ₃)	tracce
Non incluso nella composizione dell'atmosfera "secca":	
Vapore d'acqua (H ₂ O)	~0,40 % su tutta l'atmosfera, 1%-4 % alla superficie

Insolazione e Clima

Radiazione solare

Variabilità della radiazione solare

La variazione dell'insolazione è legata a due effetti

La rotazione in 24 ore delle Terra attorno al proprio asse (rotazione terrestre)

La rotazione in 365 giorni della terra attorno al Sole (rivoluzione terrestre)

Variazione giornaliera della radiazione solare

Alternarsi del giorno e della notte

Rotazione terrestre, il giorno
e la notte-periodo 24 ore

Fasce climatiche -variazioni in latitudine

Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

Variazioni climatici-struttura verticale

Data taken from: NOAA TerrainBase v1.0

Atlas of the Biosphere

Variazione annua (365 giorni) della radiazione solare con la distanza

- **L'orbita della Terra** non è una circonferenza, ma un'ellisse, di cui il Sole occupa una posizione eccentrica, trovandosi in uno dei due fuochi
- la distanza Terra-Sole durante l'anno varia da un minimo di 0,98325 U.A. al **perielio (inizio di gennaio)**
- ad un massimo di 1,01675 **all'afelio (inizio luglio)**, con una variazione del 3% del valore medio

Variazione annua della radiazione solare

Alternarsi delle stagioni

Variazione annua (365 giorni) della radiazione solare con la distanza

- Periodo di 365 giorni - l'inclinazione terrestre di $23,7^\circ$ determina la presenza delle stagioni
- **Indipendentemente dalle stagioni si ha una variazione del flusso solare che arriva a Terra del 7%.**
- La cosa che occorre notare è che: il massimo del flusso solare arriva a Terra, contrariamente a quello che si può pensare, nel pieno dell'inverno nel nostro emisfero, mentre durante la nostra estate il flusso è al minimo

L'evoluzione della stella Sole

La luminosità solare non è sempre stata la stessa (variazioni lente su intervalli di tempo di milioni di anni)

Ha influito sul clima terrestre per miliardi di anni ed agisce su lunghissimi intervalli temporali

Variabilità dell'insolazione determina le ere glaciali

Intervalli di tempo da circa 20000 a 100000 anni causati da:

1. Variazioni millenarie dei parametri orbitali eccentricità dell'orbita
2. Variazione dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre

Variabilità climatica della radiazione solare dovuta all'attività solare

Attività solare (brevi intervalli di tempo
da 2000 a 600, a 22 anni)

Sicuramente è stata importante negli ultimi 2000 anni

Può influire sul clima terrestre anche oggi

Variabilità Climatica

Il clima terrestre e l'attività solare

L'attività solare è connessa a

1. Macchie solari
2. Brillamenti
3. Protuberanze
4. E più in generale all'attività magnetica del Sole

Producono effetti su brevi periodi di tempo (decine di anni) sul clima terrestre ! Sono stati importanti per la variazione del clima negli ultimi 2000 anni

Variabilità Climatica Il clima terrestre e l'attività solare

Cicli di Milankovitch

I cicli di Milankovitch - come varia l'insolazione

I cicli di Milankovitch - come varia l'insolazione

Variazioni orbitali e clima terrestre

I cicli glaciali sono innescati da variazioni astronomiche ??

L'accendino climatico

I dati paleoclimatici suggeriscono variazioni delle quantità osservate modulate su diversi periodi tra cui quelli di:

19000, 26000, 41000 e 100000 anni

Variazioni orbitali e clima terrestre

I cicli glaciali sono innescati da variazioni astronomiche ??

Il contributo orbitale alla variazione del clima eccentricità

Eccentricità $e=0,5$ (*orbita ellittica*)

Eccentricità $e=0$ (*orbita circolare*)

Variazione dell'eccentricità dell'orbita terrestre comporta un maggior stazionamento della Terra vicino al Sole. Le variazioni di temperatura sono

$$\Delta T \sim e \cdot T_{eq}$$

hanno un periodo di 95000 e 125000 anni. Oggi l'eccentricità dell'orbita Terrestre risulta $e = 0,0167$.

Variabilità Climatica -i cicli di Milankovitch

Le variazioni orbitali non sono sufficienti per rendere conto dei cicli glaciali in quanto non modulano gli stessi periodi !

M. Milankovitch nel 1920 propose allora che, ben più importante delle variazioni dell'eccentricità fossero le variazioni dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre e della sua precessione

I cicli di Milankovitch

variazione dell'inclinazione dell'eccentricità
dell'orbita terrestre attorno al Sole

Ciclo di 100000 e 400000 anni

I cicli di Milankovitch

variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre

Variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre da $22^{\circ}30'$ a $24^{\circ}30'$ con un periodo di 41000 anni (dovuto alla risonanza tra il moto dei nodi e la precessione lunisolare)

I cicli di Milankovitch

precessione dell'asse terrestre

Precessione dell'asse terrestre con un periodo di 26000
anni

I cicli di Milankovitch precessione dell'asse terrestre

Precessione dell'asse terrestre con un periodo di 26000 anni

I cicli di Milankovitch

P A L E O S E G N A L I

Fine di un ciclo?

Fenomeni astronomici che influenzano il clima >>>>>

■ Il ruolo della Terra

La rivoluzione della Terra attorno al Sole e il suo orientamento nello spazio cambiano regolarmente. Si ritiene che questi cicli - incidendo sulla distribuzione dell'energia solare sulla superficie terrestre - influenzino le ere glaciali. Per gran parte degli ultimi 2,5 milioni di anni i cicli di caldo e freddo sono durati 41.000 anni. Circa un milione di anni fa si sono dilatati, arrivando a 100.000 anni.

Precessione degli equinozi

Ciclo di 19.000 e 23.000 anni
L'asse di rotazione inclinato genera un'oscillazione che, col tempo, forma un cerchio quasi completo.

Inclinazione dell'asse

Ciclo di 41.000 anni
L'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre è variabile.

Orbita più ellittica

Sole

Terra

Orbita più circolare

Ciclo di 100.000 e 400.000 anni
La rivoluzione della Terra attorno al Sole si espande e si contrae, passando da orbite più circolari a orbite più ellittiche.

NON IN SCALA

Marte e la Terra

	Terra	Marte
--	-------	-------

Le variazioni dell'asse terrestre sono circa 23.44 gradi

Così

l'assiale di Marte è maggiore

Andamenti climatici

La questione climatica

Si pongono due domande di straordinaria rilevanza :

1. Il clima ha cambiato la civilizzazione umana ??
2. La civilizzazione umana sta cambiando il clima ??

I principali fattori delle variazioni climatiche

L'atmosfera terrestre è in continua interazione con:

La radiazione solare

Gli oceani

I ghiacci polari e continentali

I deserti

La superficie (albedo)

I vulcani

La tundra polare

Le foreste temperate tropicali equatoriali

Le zone umide

Le nubi

Le complesse interazioni biosfera-sole-oceani