Il Sole

Primo Levi 2017
Roberto Bedogni

INAF Osservatorio Astronomico di Bologna

<http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi>

Email : roberto.bedogni@oabo.inaf.it

Sole

Il Sole nella
riga H α

Distanza (km)	149 597 970 km ± 2
Massa (kg)	$1,989 \times 10^{30}$
Massa	$332\,830 M_{\text{T}}$
Raggio equatoriale (km)	695 000
Raggio equatoriale	$109 R_{\text{T}}$
Periodo di rotazione (giorni)	25-36
Densità media (kg/m ³)	1410
Densità al centro (kg/m ³)	151300
Pressione al centro (bars)	$2,334 \cdot 10^{11}$
Pressione fotosferica (bars)	0,0001
Temperatura al centro (°K)	15,6 milioni °K
Temperatura fotosferica (°K)	5780
Temperatura coronale (°K)	Da 2 a 3 milioni °K
Velocità di fuga (km/sec)	618
Accelerazione di gravità (m/sec ²)	274
Luminosità (J/s)	$3,86 \times 10^{26}$
Magnitudine visuale	-26,8
Magnitudine assoluta bol.	4,74
Età (miliardi di anni)	4,55

L'evoluzione del Sole

Il Sole – struttura stellare interna

□ Nucleo $0 \Rightarrow 0,25 R_{\odot}$

- Dove viene prodotta l'energia
- La fusione nucleare Nucleo trasforma 7×10^{11} kg al secondo di idrogeno in elio

□ Zona Radiativa $0,25 \Rightarrow 0,75 R_{\odot}$

- l'energia viene trasportata per radiazione
- Sebbene i fotoni prodotti viaggino alla velocità della luce, vengono deviati così tante volte dal denso materiale, che impiegano circa 170000 anni (? Anche >1 Ma secondo altri autori) per raggiungere la zona convettiva

□ Zona Convettiva $0,75 \Rightarrow 1 R_{\odot}$

- L'energia viene trasportata per convezione in superficie, come in una pentola d'acqua che bolle

Energia nucleare ?

4 X

0,007 della massa di un atomo di Idrogeno è trasformata in energia

Sarà sufficiente?

Energia sviluppata in Watt

$$4 \cdot 10^{26} \text{ Watt}$$

=

400.000.000.000.000.000.000.000.000 Watt

Come avviene il processo di Fusione ?

$$m_1 + m_2 > m_3$$

δm

$$E = mc^2$$

La fusione nucleare dell'idrogeno H: ciclo p-p

Affinché due protoni possano unirsi e formare un nucleo di deuterio, D, occorre superare la barriera coulombiana, poi agiscono le forze nucleari, che tendono ad unire le due particelle.

Questa circostanza si verifica in condizioni di altissima densità e temperatura attorno ai dieci milioni di gradi

C'è un problema: l'effetto tunnel

Il ciclo protone-protone

Il Sole oggi

Il Sole oggi

Il bruciamento dell'H avviene nel nucleo e l'energia è trasportata verso la zona convettiva in modo radiativo. Il gas del nucleo è un "gas perfetto" ad alta temperatura

NB Ga=giga-anni= 10^9 anni

Età=4,55 Ga

$M_{\odot} = 1,99 \times 10^{30}$ kg

$R_{\odot} = 700\,000$ km

$L_{\odot} = 3,8 \times 10^{26}$ Watt

$T_{\odot} = 5789$ °K

Il Sole termina la fase di sequenza principale

Il Sole esaurisce l'idrogeno
nel nucleo

Età=10,9 Ga

Δ Età=durata=6,35 Ga

R= 1,58 $R_{\odot}$

L= 2,2 $L_{\odot}$

La fase di post-sequenza-1

Il Sole si trasforma in una subgigante

Età=11,6 Ga

Δ Età=durata=0,7 Ga=700 Ma

R= da 1,58 a 2,3 $R_{\odot}$

L= 2,2 $L_{\odot}$ (costante)

T= da 5517 a 4900 °K

La fase di post-sequenza-2

Il Sole diventa una gigante
rossa

Età=12,233 Ga

Δ Età=durata=0,63 Ga=630 Ma

R= da 2,3 a 166 $R_{\odot}$

L= da 2,2 a 2350 $L_{\odot}$

T= da 4900 a 3107 °K

La fase di post-sequenza-3

Il Sole brucia
l'elio nel nucleo
(flash He)

Inizio del flash dell'He

Età=12,234 Ga

Δ Età=durata=0,001

Ga=1 Ma

R= da 2,3 a 9,5 $R_{\odot}$

L= da 2350 a 41 $L_{\odot}$

T= da 4900 a 4724 °K

Fine del flash dell'He

Età=12,344 Ga

Δ Età=durata=0,11 Ga=110

Ma

R= da 9,5 a 18 $R_{\odot}$

L= da 41 a 110 $L_{\odot}$

T= da 4724 a 4450 °K

Termina la fase di post-sequenza

Il Sole esaurisce
la combustione
dell'elio nel nucleo

Età=12,344 Ga

Δ Età=durata=0,11 Ga=110 Ma

R= da 9,5 a 18 $R_{\odot}$

L= da 41 a 110 $L_{\odot}$

T= da 4724 a 4450 °K

La fase di gigante rossa

Il Sole diviene
per la seconda volta
una gigante rossa

Età=12,365 Ga

Δ Età=durata=0,021 Ga=21 Ma

La fase del Sole pulsante

Il Sole pulsa
e diviene instabile

Età=12,366 Ga

Δ Età=durata=0,001 Ga=1 Ma

La fase di Nana Bianca

Il Sole diviene
una Nana Bianca

Età >12,4 Ga

Δ Età=durata=0,034 Ga =34 Ma

Variazione del Raggio del Sole

Riassunto della sequenza evolutiva del Sole

Il percorso evolutivo del Sole

Evoluzione del Sole

Evoluzione Sole I

Evoluzione Sole II

8) Gigante Rossa 12,233 Ga
 $R=166 R_{\odot}$ $L=2350 L_{\odot}$ $T=3107 \text{ }^{\circ}\text{K}$

Evoluzione di una stella di 5 masse solari (I)

A) $T=17500$ °K $R=2,58 R_{\odot}$ $M_{bol}=-2,24$ $T_c=26,4 \times 10^6$ °K $P_c=5,5 \times 10^{10}$ atm

A-B) ciclo CNO l'idrogeno si trasforma in Elio

B-C) si riunisce una zona di convezione con mescolamento dei prodotti nucleari per un tempo di evoluzione (A-B-C) di $5,6 \times 10^7$ anni

Evoluzione di una stella di 5 masse solari (II)

E) Inizia la fusione di ${}^4\text{He}$ in ${}^{12}\text{C}$ a $T_c \sim 130-180 \times 10^6 \text{ }^\circ\text{K}$ mediante il processo 3α

D-E) Fase di Gigante Rossa